



Bij extensieve beweiding is de veebezetting lager dan gebruikelijk. Deze maatregel wordt vaak ingezet voor weidevogelbeheer en botanisch beheer, en is bedoeld om variatie in de grasmat te creëren en de bodem niet verder te verrijken maar te verschrallen. De maatregel leidt ook (bij een constant of lager bemestingsniveau) tot minder stikstofverliezen in de vorm van nitraat, ammoniak en lachgas. De grootste effecten worden bereikt met een bezetting van maximaal 1,5 GVE per ha tijdens de beweiding.

Extensivering van de beweiding leidt ertoe dat minder weidemest en daarmee minder stikstof op het perceel terecht komt. Hierdoor wordt het risico op nitraatuitspoeling en stikstofverliezen naar de lucht verlaagd. Als er daarnaast minder of helemaal niet bemest wordt kan dit ook leiden tot meer kruiden in het grasland. Dit kan een positief effect hebben op insecten en weidevogels.

Op percelen met een hoge grasproductie is een te lage veebezetting niet passend, omdat dit kan leiden tot ongewenste verruiging en verbossing van het grasland. Hier is het beter om de productie eerst naar beneden te brengen (maximaal 7 ton ds/ha) voordat extensieve beweiding toegepast wordt. Regulier wordt er gewoonlijk tijdens beweiding gewerkt met veebezettingen van tot 10 GVE per ha. Er is sprake van extensief weiden als er tot maximaal 1,5 GVE per ha wordt geweid.

Urineplekken in weiland

Waterkwaliteit

Als er minder urine en weidemest op het perceel terecht komt wordt het risico op nitraatuitspoeling verlaagd. Vooral onder urineplekken ontstaan lokaal hoge stikstofconcentraties in de bodem, waardoor meer nitraat naar het grondwater uitspoelt.

Emissies

Doordat minder stikstof op het perceel terecht komt ontstaat er ook minder lachgas op het perceel. En ook de ammoniakemissies van het veld kunnen lager worden.



Is de maatregel haalbaar

Effectiviteit



Inpasbaarheid



Weidevogels

Vooral in het voorjaar wordt extensieve beweiding ingezet als maatregel voor weidevogelbeheer. Er ontstaat meer variatie in de structuur van het grasland. In het hoge gras kunnen kuikens van weidevogels dekking vinden, en in het korte gras is de doorwaadbaarheid beter en vinden de vogels makkelijker voedsel. Mestflatten trekken daarnaast insecten aan, die als voedsel voor weidevogels dienen.

Botanische samenstelling


Extensieve beweiding kan ook ingezet worden als beheersmaatregel voor kruidenrijk grasland met een diverse botanische samenstelling. Om van een hoogproductief grasland met grotendeels Engels raaigras te komen naar grasland met veel bloemen en kruiden moet daarnaast ook de bemesting fors verlaagd of helemaal gestopt worden. Dit leidt tot daling van de grasproductie en verschaling van de grond, wat ruimte creëert voor botanisch waardevolle kruiden.

Kosten en opbrengsten

Extensieve beweiding zal gepaard (moeten) gaan met daling van de grasproductie en extensiever graslandbeheer. Dit kan, afhankelijk van het totaal bedrijfsoppervlak en het bedrijfssysteem, leiden tot een lagere melkproductie. Daarbij kan extensieve beweiding maar op bepaalde percelen toegepast worden, bijvoorbeeld waar veel weidevogels voorkomen, of op het hele bedrijf. Afhankelijk van het aandeel extensief beheerd weideland zal de impact groter of kleiner zijn.

Voor extensieve beweiding ten behoeve van weidevogelbeheer kunnen subsidies aangevraagd worden, bijvoorbeeld via het ANLb beheerpakket 106 (extensieve beweiding tussen 1 mei en 15 juni). Ook voor kruidenrijk grasland kunnen vaak vergoedingen of premies ontvangen worden.

Meer weten?



Scan de QR-code voor uitgebreide, actuele informatie over deze maatregel.

Tip:

Het is van belang om weidevogelbeheer uit te voeren in een samenhangend mozaïek van verschillend landgebruik, waardoor de omstandigheden voor alle levensfasen van weidevogels goed zijn: broedgelegenheid, rust zodat de nesten uitkomen, voldoende voedsel voor kuikens en volwassen vogels, en afwezigheid van predatoren.